

Mögliche Folgeerscheinungen von instabilem Atlas

BEIM MENSCHEN

1. Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen
2. ADS und ADSH
3. Kiss Syndrom
4. Lese-Rechtschreibschwäche
5. „Weggeträumtsein“
6. Kopfschmerzen
7. Migräne
8. Chronische Erschöpfung
9. Burn-out
10. Wortfindungsstörungen
11. innere Rastlosigkeit und Unruhe
12. Hypersensibilität
13. Nacken- und Rückenbeschwerden – Rückenschmerzen
14. Steifigkeit
15. Unbeweglich sein
16. HWS Kopfschmerzen
17. Nackenkopfschmerzen
18. Kieferfehlstellungen und Kiefergelenksbeschwerden
19. Fehlsichtigkeit
20. Sehstörungen und Hörstörungen
21. Hüftschiefstand
22. Beckenschiefstand
23. Hüft- und Kniegelenksbeschwerden
24. Schmerzen ohne erkennbare Ursache
25. Fibromyalgie
26. Gelenkrheumatismus
27. Arthrose und Arthritis
28. Gicht
29. Nahrungsmittelunverträglichkeiten: Gluten- und Laktose Intoleranz
30. Diabetes 2
31. Schwindel
32. Einschlafende Arme und Beine
33. Durchblutungsstörungen
34. Karpaltunnelsyndrom
35. organische Störungen verschiedenster Art
36. Verdauungsstörungen
37. Chronischer Durchfall oder Verstopfung
38. CFS
39. Chronic Fatigue Syndrom
40. Innere Leere
41. Depression
42. Angststörungen
43. Aggression
44. Schlafstörungen
45. chronische Energielosigkeit und Müdigkeit